

Адвантікс®
(Краплі для зовнішнього застосування)
листівка–вкладка

Опис

Прозорий розчин від жовтого до коричневого кольору.

Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:

імідаклоприд – 10,0 г,

перметрин – 50,0 г.

Допоміжні речовини: бутил гідрокситолуол, N-метилпіролідон, мігліол 812, лимонна кислота.

Фармакологічні властивості

ATC vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC54, перметрин, комбінації)

Адвантікс® – це ектопаразитицид, до складу якого входять діючі речовини імідаклоприд, який має хлорнікотинілову структуру та перметрин - синтетичний піретроїд. Ця комбінація речовин діє як, інсектицид, акарицид та забезпечує репелентну активність препарату тим самим знижуючи ризик захворювання трансмісивними захворюваннями собак (CVBD) такими як бореліоз, рікетсіоз, ерліхіоз, лейшманіоз.

Діюча речовина препарату *Імідаклоприд*, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотинергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотинергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу нервового імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців обумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар’єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату, імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини впродовж одного дня після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

Перметрин, - циклопропанкарбоксилова кислота, 3-(2,2-дихлоретил) 2,2-диметил-,(3-феноксиfenіл) метилестер - належить до першого класу піретроїдів. Піретроїди викликають порушення електропровідності натрієвих каналців у хребетних та безхребетних. Піретроїди порушують здатність натрієвих каналців до активації та інактивації. Це викликає стан перезбудження та тремор, судоми дорсальних м'язів та загибель паразита.

Адвантікс® - препарат для зовнішнього застосування, після нанесення на шкіру швидко розподіляється по всій поверхні тіла тварини. Ефективність обох діючих речовин на шкірі та шерсті тварин триває протягом 4-х тижнів.

Застосування

Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*), блохами (*Ctenocephalides spp.*), вошами (*Trichodectes canis*), волосоїдами. Відлякування москітів, комарів та мух у собак.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження блохами і кліщами протягом 4-х тижнів.

Препарат також можна застосовувати для лікування алергічного блошиного дерматиту.

Дозування

Мінімальна рекомендована доза препарату - 10 мг імідаклопріду та 50 мг перметрину на 1 кг маси тіла. Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні піпетки препарату:

Собаки масою тіла, кг	Торгова назва	Об'єм, мл	Імідаクロприд (мг/кг м.т.)	Перметрин (мг/кг м.т.)
до 4	Адвантікс® (для собак масою тіла до 4 кг)	0,4	мінімум 10	мінімум 50
4 - 10	Адвантікс® (для собак м. т. від 4 кг до 10 кг)	1,0	10-25	50-125
10 - 25	Адвантікс® (для собак м. т. від 10 кг до 25 кг)	2,5	10-25	50-125
25 - 40	Адвантікс® (для собак м. т. від 25 кг і більше)	4,0	10-16	50-80

Для собак масою тіла більше 40 кг необхідно використовувати відповідну комбінацію піпеток.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження кліщами протягом 4-х тижнів.

Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів, тому рекомендується постійно обробляти місця перебування тварин.


Одноразова обробка захищає тварин від москітів, комарів та мух протягом 4-х тижнів, що знижує ризик виникнення трансмісивних хвороб.

Препарат залишається ефективний при намоканні шерсті тварини, однак залежно від присутності бліх у зовнішньому середовищі, допускається додаткова обробка. У таких випадках препарат можна застосовувати не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Купати собак із застосуванням шампуню можна перед обробкою препаратом Адвантікс® або через 2 тижні після обробки.

Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видавивши фольгу.



При обробці тварини повинні бути у стоячому положенні.

Собаки до 10 кг:

Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, і нанесіть весь вміст безпосередньо на шкіру.

Собаки більше 10 кг:

Препарат наносять у 3-4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуєчи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру та обережно стисніть піпетку і рівномірно нанесіть вміст піпетки вздовж хребта. При нанесенні

препарату на шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злизування твариною нанесеного засобу.

Протипоказання

Не застосовувати цуценятам віком до 7-ми тижнів.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

Не застосовувати котам.

Застереження

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу.

Обробку тварин рекомендується проводити у захисних рукавицях.

Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милом.

При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Розчинник, що входить до складу Адвантікс®, може залишати плями на таких матеріалах як шкіра, тканини, пластик та інші поверхні. Тому після обробки тварин намагайтесь не допускати контакту тварини з подібними матеріалами до повного висихання шерсті.

Форма випуску

Білі пропіленові піпетки з пластиковими кришечками по 0,4мл (Адвантікс® для собак масою тіла до 4 кг), 1,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 4-10 кг), 2,5 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 10-25 кг), 4,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла від 25 кг і більше) запаковані в індивідуальні алюмінієві упаковки.

Зберігання

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому приміщенні, на стелажах при температурі від 5 до 25 °C.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

Термін придатності

5 років.

Для застосування у ветеринарній медицині!

Власник реєстраційного посвідчення

Байер Енімал Хелс ГмбХ

D-51368, Леверкузен, Німеччина

Bayer Animal Health GmbH (Germany) D-

51368, Leverkusen

Виробник готового продукту

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,

Німеччина

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH

(Germany) Projensdorfe Str. 324, D-24106 Kiel

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АА-05098-03-14
від 03.04. 2014 року

advantix®

81355169

Адвантікс®
для собак масою тіла до 4 кг
Адвантікс®
для собак масою тела до 4 кг

105 x 25 x 195

4 Містить
тюбики

до 4 кг

advantix®

advantix®

Адвантікс®
для собак масою тіла до 4 кг

Упаковка містить 4 тюбики об'ємом 0,4 мл кожий.
Для зовнішнього застосування.
Не застосовувати для кішок.

Показання до застосування та дозування:
Адвантікс® забезпечує захист собак від ураження блоками, кліщами, комарами, москітами та мухами протягом 4 тижнів.
Один тюбик призначений для собак масою тіла до 4 кг (мінімальна доза складає 10 мг/кг імідаクロптиду, 50 мг/кг перметріну).
Адвантікс® ефективний при лікуванні алергічного блошиного дерматиту, безпечної для вагінних та лакуючих самок.

Способ застосування:
спот-он (рів. листовку-вкладку).

Умови зберігання:
В непрорізтій упаковці виробника, в сухому, захищенному від світла, недоступному для дітей і тварин місці, окрім від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0 до 25°C.

Власник реєстраційного посвідчення:
Bayer Animal Health GmbH,
Леверкузен, Німеччина.

Виробник:
КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмБХ,
Німеччина.
РП від

Bayer

Серія №/Серія №:
Дата виготовлення/Дата виробства:
Придатний до/Годен до:

400221052896

4 Містить
тюбики

БА
AYER

advantix®

Адвантікс®
для собак масою тіла до 4 кг

Упаковка містить 4 тюбика об'ємом 0,4 мл кожий.
Для наружного застосування.
Не применять кошкам.

Показання к применению и дозировка:
Адвантікс® обеспечивает защиту от нападения клещей, блох, комаров, москитов и мух на протяжении 4 недель. Один тюбик предназначен для собак массой тела до 4 кг (минимальная доза составляет 10 мг/кг имидаклоптида, 50 мг/кг перметрина).
Адвантікс® эффективен при лечении аллергического блошиного дерматита. Разрешен к применению беременным и лактирующим сакам.

Способ применения:
спот-он (см. листовку-вкладку).

Условия хранения:
В непрорезтой упаковке изготовителя, в сухом, защищенном от света, недоступном для детей и животных месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 0 до 25°C.

Владелец регистрационного
свидетельства:
Bayer Animal Health GmbH,
Леверкузен, Германия.

Производитель:
КВП Фарма и Ветеринар-Продукт ГмБХ,
Германия.

advantix®

Адвантікс®
для собак масою тіла від 4 до 10 кг.
Адвантікс®
для собак масою тіла від 4 до 10 кг.

4 Містить
тюбики

105 x 25 x 195

81355207

BAYER

4-10 кг

advantix®

advantix®

Адвантікс®
для собак масою тіла від 4 до 10 кг

Упаковка містить 4 тюбика об'ємом 1,0 мл кожний.
Для зовнішнього застосування.
Не застосовувати для кішок.

Показання до застосування та дозування:
Адвантікс® забезпечує захист собак від нападення клешчами, кліщами, комарами, москітами та мухами протягом 4 тижнів. Один тюбик призначений для собак масою тіла від 4 до 10 кг (мінімальна доза складає 10 мг/кг індаклопріду, 50 мг/кг перметріну).
Адвантікс® ефективний при лікуванні алергічного блішевого дерматиту. Безпечної для вагітних та лакуючих самок.

Способ застосування:
спот-он (див. листівку-вкладку).


Умови зберігання:
В нерозкритій упаковці виробника, в сухому, захищенні від світла, недоступному для дітей і тварин місяць, окрім від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0 до 25°C.

Власник реєстраційного посвідчення:
Bayer Animal Health GmbH,
Леверкузен, Німеччина.


Виробник:
КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмБХ,
Німеччина.
РП від

Серія №/Серія №:
Дата виготовлення/Дата производство:
Придатний до/Годен до:

Bayer



<p>advantix® для собак масою тіла від 10 до 25 кг</p> <p>advantix® для собак масою тіла от 10 до 25 кг</p> <p>Упаковка містить 4 тюбика об'ємом 2,5 мл кожний. Для зовнішнього застосування. Не застосовувати для кішок.</p> <p>Показання до застосування та дозування: Адвантікс® забезпечує захист собаки від ураження бліхами, кліщами, комарями, москітами та мухами протягом 4 тижнів. Один тюбик призначений для собак масою тіла від 10 до 25 кг (мінімальна доза складає 10 мг / кг імдаクロптиду, 50 мг/кг перметрину). Адвантікс® ефективний при лікуванні алергічного блошиного дерматита. Безпечний для вагітних та лактуючих самок.</p> <p>Способ застосування: спот-он (див. листівку-вкладку).</p> <p>Умови зберігання: В нерозрітій упаковці виробника, в сухому, захищенні від світла, недоступному для дітей і тварин місці, окрім від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0 до 25°C.</p> <p>Власник регистраційного посвідчення: Bayer Animal Health GmbH, Леверкузен, Німеччина.</p> <p>Виробник: КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ІМБХ, Німеччина. РП від</p> <p>Серія №/Серія №: Дата виготовлення/Дата производства: Грифатник доГоден до:</p>	<p>advantix® для собак масою тіла от 10 до 25 кг</p> <p>Упаковка містить 4 тюбика об'ємом 2,5 мл кожний. Для наружного застосування. Не применять кошкам.</p> <p>Показания к применению и дозировка: Адвантікс® обеспечивает защиту от нападения клещей, блох, комаров, москитов и мух на протяжении 4 недель. Один тюбик предназначен для собак массой тела от 10 до 25 кг (минимальная доза составляет 10 мг/кг имдаクロптида, 50 мг/кг перметрин). Адвантікс® эффективен при лечении аллергического блошиного дерматита. Разрешен к применению беременным и пактирующим самкам.</p> <p>Способ применения: спот-он (см. листовку-вкладку).</p> <p>Условия хранения: В не вскритій упаковці виробника, в сухому, защищенні від світла, недоступному для дітей і животних місці, отдельно від продуктів харчування і кормів, при температурі від 0 до 25°C.</p> <p>Владелец регистрационного свидетельства: Bayer Animal Health GmbH, Леверкузен, Германия.</p> <p>Производитель: КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ІМБХ, Германия.</p> <p>Bayer</p>
--	--



Серія №/Серия №:
Дата виготовлення/Дата производства:
Приданний додаток до:

ПРОЕКТ ПІНЕТОК

Додаток 3
до реєстраційного посвідчення АА-05098-03-14
від 03.04.2014 року

<p>advantix®</p> <p>Адвантікс® краплі для собак масою тіла від 4 до 10 кг Адвантікс® Капли для собак</p> <p>(ш) Кожен тюбик по 0,4 мл містить: Імдаценоприд 40 мг, Перметрин 200 мг Для профілактики і лікування заражений собак. Від кліщів і бліх, відлякує комарів, москітів та мух. Тільки для тварин. НЕ ЗАСТОСОВУХАТИ КОТАМ. Номер серії та термін придатності: див. штамп. Використати до закінчення терміну придатності указаного на пінекте.</p> <p></p>	<p>advantix®</p> <p>Адвантікс® краплі для собак масою тіла від 10 до 25 кг Адвантікс® Капли для собак</p> <p>(ш) Кожен тюбик по 2,5 мл містить: Імдаценоприд 250 мг Перметрин 1250 мг Для профілактики і лікування заражений собак. Від кліщів і бліх, відлякує комарів, москітів та мух. Тільки для тварин. НЕ ЗАСТОСОВУХАТИ КОТАМ. Номер серії та термін придатності: див. штамп. Використати до закінчення терміну придатності указаного на пінекте.</p> <p></p>	<p>advantix®</p> <p>Адвантікс® краплі для собак масою тіла від 4 до 10 кг Адвантікс® Капли для собак</p> <p>(ш) Кожен тюбик по 1 мл містить: Імдаценоприд 100 мг Перметрин 500 мг Для профілактики і лічения заражений паразитами собак. Від кліщів і бліх, відлякує комарів, москітів та мух. Тільки для тварин. Тільки для наружного застосування. НЕ ЗАСТОСОВУХАТИ КОТАМ. Номер серії та термін придатності: див. штамп. Використати до закінчення терміну придатності указаного на пінекте.</p> <p></p>	<p>advantix®</p> <p>Адвантікс® краплі для собак масою тіла від 10 до 25 кг Адвантікс® Капли для собак</p> <p>(ш) Кожен тюбик по 4 мл містить: Імдаценоприд 400 мг Перметрин 2000 мг Для профілактики і лікування заражений паразитами собак. Від кліщів і бліх, відлякує комарів, москітів та мух. Тільки для тварин. Тільки для наружного застосування. НЕ ЗАСТОСОВУХАТИ КОТАМ. Номер серії та термін придатності: див. штамп. Використати до закінчення терміну придатності указаного на пінекте.</p> <p></p>
---	--	---	--

ПРОЕКТ ФОЛЬГИ

Додаток 3
до реєстраційного посвідчення АА-05098-03-14
від 03.04.2014 року

<h1>advantix®</h1> <p>Адвантікс® Краплі для собак масою тіла до 4 кг Адвантікс® Капли для собак масою тела до 4 кг</p> <p>Тільки для тварин. Для зовнішнього застосування. Кожен тобик містить: Імдақлонприд 40 мг Перметрин 200 мг Номер серії та термін придатності на упаковке. Не застосовувати котам. Не застосовувати котам.</p> <p>4 тобики/4 тобика 0,4 мл</p>  	<h1>advantix®</h1> <p>Адвантікс® Краплі для собак масою тіла від 4 до 10 кг Адвантікс® Капли для собак масою тела от 4 до 10 кг</p> <p>Тільки для тварин. Для зовнішнього застосування. Кожен тобик містить: Імдақлонприд 100 мг Перметрин 500 мг Номер серії та термін придатності на упаковке. Не застосовувати котам. Не застосовувати котам.</p> <p>4 тобики/4 тобика 1,0 мл</p>  	<h1>advantix®</h1> <p>Адвантікс® краплі для собак масою тіла до 4 кг Адвантікс® Капли для собак масою тела до 4 кг</p> <p>Тільки для тварин. Для зовнішнього застосування. Кожен тобик містить: Імдақлонприд 2000 мг, Перметрин 2000 мг. Номер серії та термін придатності див на упаковку. Не застосовувати котам. Для собак масою тіла понад 40 кг застосовувати необхідну комбінацію піпеток. 4 тобики/4 тобика 0,4 мл</p>  	<h1>advantix®</h1> <p>Адвантікс® краплі для собак масою тіла від 10 до 25 кг Адвантікс® Капли для собак масою тела от 10 до 25 кг</p> <p>Тільки для тварин. Для зовнішнього застосування. Кожен тобик містить: Імдақлонприд 250 мг Перметрин 1250 мг Номер серії та термін придатності див на упаковку. Не застосовувати котам. Не застосовувати котам.</p> <p>4 тобики/4 тобика 2,5 мл</p>  
--	--	---	---

Коротка характеристика препарату

1. Назва

Адвантікс®

2. Склад

100 мл препарату містять діючі речовини:
імідаклоприд – 10,0 г,
перметрин – 50,0 г.

Допоміжні речовини: бутил гідрокситолуол, N-метилпіролідон, мігліол 812, лимонна кислота.

3. Фармацевтична форма

Краплі для зовнішнього застосування.

4. Фармакологічні властивості

ATC vet: QP53, ектопаразитициди, інсектициди і репеленти (QP53AC54, перметрин, комбінації)

Адвантікс® – це ектопаразитицид, до складу якого входять діючі речовини імідаклоприд, який має хлорнікотинілову структуру та перметрин - синтетичний піретроїд. Ця комбінація речовин діє як, інсектицид, акарицид та забезпечує репелентну активність препарату. Завдяки такому типу дії препарат знижує ризик захворювання трансмісивними захворюваннями собак (CVBD), такими як бореліоз, рикетсіоз, ерліхіоз, лейшманіоз.

Діюча речовина препарату *Імідаклоприд, 1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamine* – ектопаразитицид, що належить до групи хлорнікотинілових сполук. Має високу спорідненість до нікотінергічних ацетилхолінових рецепторів у постсинаптичних ділянках центральної нервової системи бліх. Він приєднується до нікотінергічного рецептора блохи, розміщеного на постсинаптичному нейроні, перериває передачу первого імпульсу, що в подальшому призводить до загибелі паразита.

Слабка взаємодія імідаклоприду з нікотиновими рецепторами ссавців обумовлює низький рівень проникнення через гематоенцефалічний бар'єр, тому імідаклоприд практично не впливає на ЦНС тварин. Імідаклоприд ефективний проти личинок бліх та зрілих особин.

Після місцевого застосування препарату, імідаклоприд швидко розповсюджуються по всій шкірі тварини впродовж одного дня після нанесення. Клінічно доведено, що системна абсорбція препарату дуже низька.

Перметрин, - циклопропанкарбоксилова кислота, 3-(2,2-дихлоретил) 2,2-диметил-,(3-феноксифеніл) метилестер - належить до першого класу піретроїдів. Піретроїди викликають порушення електропровідності натрієвих каналців у хребетних та безхребетних. Піретроїди порушують здатність натрієвих каналців до активації та інактивації. Це викликає стан перебудження та тремор, судоми дорсальних м'язів та загибель паразита.

Адвантікс® - препарат для зовнішнього застосування, після нанесення на шкіру швидко розподіляється по всій поверхні тіла тварини. Ефективність обох діючих речовин на шкірі та шерсті тварин триває протягом 4-х тижнів.

5. Клінічні особливості

5.1 Вид тварин

Собаки.

5.2 Показання до застосування

Профілактика та лікування собак при ураженні кліщами (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*), блохами (*Ctenocephalides spp.*), вошами (*Trichodectes canis*), волосоїдами. Відлякування москітів, комарів та мух у собак.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження блохами і кліщами протягом 4-х тижнів. Препарат також можна застосовувати для лікування алергічного блошиного дерматиту.

5.3 Протипоказання

Не застосовувати цуценятам віком до 7-ми тижнів.

Не застосовувати тваринам з відомою гіперчутливістю до складових препарату.

Не застосовувати котам.

5.4 Побічна дія

У рідких випадках застосування препарату може викликати подразнення шкіри (свербіж, почевоніння), пригнічення, які самовільно проходять.

5.5 Особливі застереження при використанні

Немає.

5.6 Використання під час вагітності, лактації, несучості

Застережень немає.

5.7 Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії

Невідомо.

5.8 Дози і способи введення тваринам різного віку

Мінімальна рекомендована доза препарату - 10 мг імідаклопріду та 50 мг перметрину на 1 кг маси тіла. Відповідно до маси тіла тварин рекомендується застосовувати відповідні піпетки препарату:

Собаки масою тіла, кг	Торгова назва	Об'єм, мл	Імідаклоприд (мг/кг м.т.)	Перметрин (мг/кг м.т.)
до 4	Адвантікс® (для собак масою тіла до 4 кг)	0,4	мінімум 10	мінімум 50
4 - 10	Адвантікс® (для собак м. т. від 4 кг до 10 кг)	1,0	10-25	50-125
10 - 25	Адвантікс® (для собак м. т. від 10 кг до 25 кг)	2,5	10-25	50-125
25 - 40	Адвантікс® (для собак м. т. від 25 кг і більше)	4,0	10-16	50-80

Для собак масою тіла більше 40 кг необхідно використовувати відповідну комбінацію піпеток.

Одноразова обробка захищає тварин від ураження кліщами протягом 4-х тижнів.

Повторна інвазія блохами із зовнішнього середовища можлива через 6 тижнів, тому рекомендується постійно обробляти місця перебування тварин.


Одноразова обробка захищає тварин від москітів, комарів та мух протягом 4-х тижнів, що знижує ризик виникнення трансмісивних хвороб.

Препарат залишається ефективний при намоканні шерсті тварини, однак залежно від присутності бліх у зовнішньому середовищі, допускається додаткова обробка. У таких випадках препарат можна застосовувати не частіше, ніж 1 раз на тиждень.

Купати собак із застосуванням шампуню можна перед обробкою препаратом Адвантікс® або через 2 тижні після обробки.

Спосіб застосування:

Вийміть піпетку з упаковки, у вертикальному положенні зніміть ковпачок, переверніть його та одягніть на піпетку, таким чином видаливши фольгу.



При обробці тварини повинні бути у стоячому положенні.

Собаки до 10 кг:

Розділіть шерсть між лопатками так, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть вузький кінець піпетки на шкіру, міцно стисніть піпетку декілька разів, і нанесіть весь вміст безпосередньо на шкіру.

Собаки більше 10 кг:

Препарат наносять у 3-4 точки вздовж хребта, починаючи між лопатками і закінчуячи біля кореня хвоста. При кожному нанесенні потрібно розгорнути шерсть таким чином, щоб було видно шкіру. Препарат наноситься на непошкоджену шкіру. Розмістіть кінчик піпетки на шкіру та обережно стисніть піпетку і рівномірно нанесіть вміст піпетки вздовж хребта. При нанесенні препарату на шкіру уникайте попадання препарату в одне місце та не допускайте можливість злизування твариною нанесеного засобу.

5.9 Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти)

Передозування препарату у 5 разів від рекомендованої дози не викликало ніяких симптомів передозування у цуценят та дорослих собак.

Отруєння препаратом Адвантікс® шляхом випадкового перорального попадання малоймовірно, у таких випадках проводиться симптоматичне лікування тварин під контролем лікаря ветеринарної медицини. Специфічного антидоту немає. При випадковому пероральному попаданні препарату можливі ускладнення нервового характеру (тремор, пригнічення).

5.10 Спеціальні застереження

При обробці тварин уникати попадання препарату в очі та всередину (травний канал).

5.11 Період виведення (каренція)

Для непродуктивних тварин не регламентується.

5.12 Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу

Під час роботи з препаратом не дозволяється палити, пити і приймати їжу.

Обробку тварин рекомендується проводити у захисних рукавицях.

Після закінчення роботи необхідно вимити руки теплою водою з милем.

При випадковому попаданні препарату на шкіру або слизові оболонки його необхідно відразу промити проточною водою. Якщо після попадання препарату на шкіру або в очі подразнення після промивання водою не зникає, необхідно звернутися за медичною допомогою.

Розчинник, що входить до складу Адвантікс®, може залишати плями на таких матеріалах як шкіра, тканини, пластик та інші поверхні. Тому після обробки тварин намагайтесь не допускати контакту тварини з подібними матеріалами до повного висихання шерсті.

6. Фармацевтичні особливості

6.1 Форми несумісності (основні)

Невідомі.

6.2 Термін придатності

5 років.

6.3 Особливі заходи зберігання

Препарат зберігають у сухому темному, добре вентильованому приміщенні, на стелажах при температурі від 5 до 25 °C.

Зберігати окремо від продуктів харчування та кормів.

6.4 Природа і склад контейнера первинного пакування

Білі пропіленові піпетки з пластиковими кришечками по 0, 4мл (Адвантікс® для собак

Продовження додатку 2
до реєстраційного посвідчення АА-05098-03-14
від 03.04. 2014 року

масою тіла до 4 кг), 1,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 4-10 кг), 2, 5 мл (Адвантікс® для собак масою тіла 10-25 кг), 4,0 мл (Адвантікс® для собак масою тіла від 25 кг і більше) запаковані в індивідуальні алюмінієві упаковки.

6.5 Особливі заходи безпеки при поводженні з невикористаним препаратом або із його залишками

Невикористаний препарат та тара повинні бути знешкоджені у відповідності з національними вимогами.

Не допускати попадання препарату у водойми, оскільки він небезпечний для риби.

7. Назва і місце знаходження власника реєстраційного посвідчення

Байєр Енімал Хелс ГмбХ

Bayer Animal Health GmbH (Germany)

D-51368, Леверкузен, Німеччина

D-51368, Leverkusen

8. Назва і місце знаходження виробника

КВП Фарма і Ветеринар-Продукт ГмбХ

KVP Pharma+Veterinar Produkte GmbH

Проєнсдорфер стр. 324, D-24106 Кіль,

(Germany) Projensdorfe Str. 324, D-24106 Kiel

Німеччина

9. Додаткова інформація